

TEST PITANJA ZA STUDENTSKI ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE

1. Emetropno oko podrazumeva takav odnos između moći prelamanja i veličine prednje-zadnjeg dijametra očne jabučice, da se svetlosni zraci koji dolaze iz daljine prelamanju i seku, a bez učesća akomodacije:
 - a. ispred makule
 - b. u samoj makuli
 - c. iza makule
 - d. na konačnoj udaljenosti ispred makule
 - e. na određenoj udaljenosti iza makule
2. Prve presbiopne tegobe se javljaju u 45 godina života kod:
 - a. miopa
 - b. hipermetropa
 - c. astigmatizma
 - d. emetropa
 - e. visoke progresivne miopije
3. Trahom je:
 - a. specifični akutni keratokonjunktivitis
 - b. specifični keratokonjunktivitis hroničnog toka
 - c. može biti akutan i hroničan
 - d. izaziva ga bakterija
 - e. izaziva ga virus
4. Epidemijski keratokonjunktivitis je izazvan:
 - a. virusom
 - b. bakterijama
 - c. može i jednim i drugim
 - d. hlamidijama
 - e. gljivama
5. Pterygium je:
 - a. duplikatura vežnjače koja prelazi na rožnjaču
 - b. duplikatura rožnjače koja prelazi na vežnjaču
 - c. znak dugotrajnog hroničnog konjunktivitisa
 - d. benigni tumor
 - e. potencijalno maligni tumor
6. Osnovna opasnost koja preči bolesniku sa hroničnim gnojnim dakriocistitisom i glavni razlog za naše insistiranje da se takav problem reši energično i trajno (dakriocistorrhinostomija) je:
 - a. opasnost od infekcije rožnjače posle ponekad i minimalne traume (ulazna vrata), usled stalnog prisustva gnoja u sakusnu vežnjaču
 - b. latentna opasnost od sepse
 - c. opasnost od širenja infekcije u nos i sinuse, jer je obično reč o rezistentnim klicama
 - d. štetno toksično dejstvo raspadnih produkata (gnoja, detritusa), posebno kod dece
 - e. opasnost od širenja put transjuna i orbite
7. U slučaju bilateralnih multipnih mikroerozija rožnjače posle izlaganja dejstvu ultravioletnih zrakova (ophthalmia electrica), realna opasnost od infekcije je:
 - a. veoma velika (mnogoštvo erozija, trljanje očiju prljavim rukama...)
 - b. velika (otvorena ulazna vrata)
 - c. velika, posebno kod osoba sa hroničnim konjunktivitisom ili blefaritisom
 - d. mala, osim kod osoba sa sniženim imunitetom
 - e. praktično niska, zbog ekstremne epifore
8. Sveže povredeno oko, posle pružanja prve pomoći, treba zaštititi zavojem u toku transporta do oftalmologa. Najvažniji izuzetak od ovog pravila, kada oko nikada ne treba pokrivati, su:
 - a. termičke povrede (opekotine)
 - b. hemijske povrede (kazuone)
 - c. kontuzione povrede bez diskontinuiteta tkova (rane na površini)
 - d. probojne povrede
 - e. inficirane povrede (kod sumnje na gasnu gangrenu)

12. Roznijača ima:

- a) četiri sloja
- b) dva sloja
- c) šest slojeva
- d) pet slojeva**
- e) tri sloja

13. Pyocyanus keratitis:

- a) ima perakutni, buran tok**
- b) hroničnog je toka
- c) cesce je hroničan
- d) reško je hroničan
- e) ima akutni tok

14. Kod distrofije roznijace:

- a) zapaljenska reakcija je minimalna
- b) nema zapaljenske reakcije**
- c) zapaljenska reakcija može biti burna
- d) promene su uvek jednostrane
- e) virusne superinfekcije su cesce

15. Toksoplazmoza:

- a) najcesce izaziva iridociklitis
- b) reško izaziva skleritis
- c) najcesce izaziva retinohoroiditis**
- d) može dovesti do porasta intraokularnog pritiska
- e) može dovesti do zapaljenja orbice

16. Retinoputhia pigmentosa se karakterise:

- a) degenerativnim promenama na periferiji ocnog dna**
- b) degenerativnim promenama uz papilu
- c) degenerativnim promenama samo u makuli
- d) degenerativnim promenama uz arterije
- e) degenerativnim promenama uz arterije i vene

17. Pars optica retine se pruza do:

- a) ekvatora mreznjace
- b) cilijarnih nastavaka
- c) ore serate
- d) na dva milimetra oko papile**
- e) horiokapilarisa

18. Statiasio telo je:

- a) zamućeno na bazi
- b) providno
- c) zamućeno na ekvatoru
- d) providno svuda osim oko papile**
- e) neprovidno

19. Eals-ova bolest se karakterise:

- a) bolovima pri pokretu oka
- b) juvenilnim recidiviranim hemoragijama**
- c) binazalnom hemianopsijom
- d) povremenim skokovima intraokularnog pritiska
- e) juvenilnim recidiviranim spazmom arterija retine

20. Kojim od sledećih testova se može proceniti velicina manifestne devijacije?

- a) testom kornealnih svetlosnih refleksa
- b) pažljivo analizom dukcija
- c) pažljivom analizom dukcija i verzija zajedno**
- d) meranjem srtine fuzije
- e) ispitivanjem retinalne korespondencije

TEST PITANJA ZA STUDENTSKI ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE, 10.mart 2005.

Na svako postavljeno pitanje ponudjeno je tri do pet odgovora, od kojih je samo JEDAN tačan. Znakruzi TAČAN odgovor.

1. Najdalja tačka jasnog vida, punctum remotum, nalazi se na konjunciji, određenoj udaljenosti od oka kod:

- a) emetropije
- b) hipermetropije
- c) miopije
- d) astigmatizma
- e) ni u jednom slučaju

2. Ambliopija:

- a) se obično javlja na oba oka
- b) je motorni poremećaj
- c) je oštrina vida oštrina koja se može korigovati korekcionim staklima
- d) leći se odgovarajućom optičkom korekcijom i zatvaranjem bojnog oka
- e) može se javiti do dvanaesle godine života

3. U zrelom životnom dobu može doći do nastanka:

- a) neuralizacije
- b) anormalne retinalne korespondencije
- c) ambliopije
- d) ambliopnog nistagmusa
- e) diplopija

4. Pokreti jedne očne jabučice nazivaju se:

- a) pokretima verzije
- b) pokretima dukcije
- c) pokretima rotacije

5. Pravać akcionog polja (diagnostički pravac pogleda) gornjeg pravog ocnog mišića je:

- a) pogled na gore i temporalno za 23
- b) pogled nazalno i dole za 50
- c) pogled nazalno i gore za 23

6. Oba kapka sadrže po jedan mali glatki mišić (m. tarsalis sup. et inf. Muller) Inervisan:

- a) parasympatikusom
- b) simpaticusom
- c) n. facialis
- d) n. trigeminus
- e) n. oculomotorius

7. Entropion je:

- a) uvrtaenje ruba kapaka prema očnoj jabučici
- b) izvrtaenje ruba kapaka put spolja
- c) uvrtaenje trepavica put unutra
- d) izvrtaenje trepavica
- e) srsocejanje gornjeg i donjeg kapka

8. Dacryocystitis acuta:

- a) nastaje postoperano
- b) nastaje naglo
- c) proizlazi iz hroničnog
- d) ne proizlazi iz hroničnog
- e) uvek se završava fistulom

9. Epidemijani keratokonjunktivitis je:

- a) virusni
- b) bakterijski
- c) može biti i jedno i drugo
- d) izazivaju ga chlamiđiae
- e) glijivici

10. Konjunktivitis vernalis:

- a) cesci je kod muske dece
- b) cesci je kod zenske dece
- c) poofjednako je zastupljen kod oba pola
- d) kod odraslih se sreće samo u toplim krajevima
- e) kod obojenja suzne zjlezde je samo o prateća manifestacija

11. Melanoma malignum conjunctivae je:

- a) veoma malignan tumor
- b) potencijalno malignan
- c) malignan ali retko metastazira
- d) uopšte ne daje metastaze
- e) daje metastaze samo u okolne strukture